C型肝炎の最新情報

広島大学病院 消化器・代謝内科

高橋祥一

C型慢性肝炎(1b型高ウイルス)に対する IFNの治療成績の変遷

C型肝炎ウイルスの構造と複製

Direct-acting Anti-viral Agent (DAA)

NS3/4Aプロテアーゼ阻害剤

NS5A阻害剤

NS5Bポリメラーゼ阻害剤

臨床試験進行中のDAA

プロテアーゼ阻害剤

第一世代

Telaprevir

SCH50304 (Boceprevir)

第二世代

MK-7009 (Vaniprevir)

TMC435 (Simeprevir)

BI 201335

BMS-650032 (Asunaprevir)

ABT-450

MK-5172

GS-9256

ACH-806

ACH-1625 (Sovaprevir)

PHX 1766

NS5A阻害剤

BMS-790052 (Daclatasvir)

ABT-267

AZD7295

PPI-461

ポリメラーゼ阻害剤

ANA598 (Setrobuvir)

RG7128 (Mercitabine)

GS 9190 (Tegobuvir)

R7128

PF-868554

IDX184

IDX375

ABT-333

A-837093

GS-7977

ABT-072

GS-938

ABT-333

INX08189

BI 207127

VX-222

Filibuvir

VX-759

ALS-2200

C型肝炎に対する新薬

- a. ペグインターフェロン+リバビリン+ α の
3剤併用療法
- a. ペグインターフェロン+リバビリン+ α + β の
4剤併用療法
- a. インターフェロン無しの内服薬2剤併用療法

ペグインターフェロン+リバビリン+テラプレビルの 3剤併用療法

テラビック (250 mg)

**1回3錠を1日3回食後服薬する
(9錠, 2,250 mg/日)**

HCV RNA累積陰性化率

テラプレビル+PegIFN/RBV 3剤併用療法 第III相試験 (国内)

IL28B genotype別の テラプレビル/PegIFN- α /RBV併用療法のSVR率

平成24年のC型慢性肝炎に対する初回治療ガイドライン

		Genotype 1	Genotype 2
ウイルス量	<u>高ウイルス量</u> 5.0 Log IU/mL以上 300fmol/L以上 1Meq./mL以上	Peg-IFNa2b : Peg-Intron (24週間) +Ribavirin : Rebetol (24週間) +Telaprevir : Teravic (12週間)	Peg-IFNa2b : Peg-Intron +Ribavirin : Rebetol (24週間) IFNβ : Feron + Ribavirin : Rebetol (24週間)
	<u>低ウイルス量</u> 5.0 Log IU/mL未満 300fmol/L未満 1Meq./mL未満	IFN (24週間) Peg-IFNa2a : Pegasys (24-48週間)	IFN (8 - 24週間) Peg-IFNa2a : Pegasys(24-48週間)

★Genotype 1・高ウイルス量症例では、治療効果に寄与するホスト側の因子であるIL28Bの遺伝子及び、ウイルス側の因子である遺伝子変異（ISDR及びCore領域aa70）等を参考にして、治療の開始を決定するのが望ましい。

★年齢、Hb値、性別を考慮して、Telaprevirを含む3者併用療法を行うことが困難と予測される場合は、IFN+Ribavirin併用療法を選択する。

★ Genotype 1、2ともにうつ病・うつ状態などの副作用の出現が予測される症例、高齢者などの副作用出現のリスクが高い症例に対しては、IFNβ+Ribavirin併用療法を選択することが望ましい。

テラプレビル/PEG-IFN/RBV療法の初期ウイルス量

HCV RNA
(log IU/mL)

ウイルス陰性化率

87%
(59/70例)

97%
(60/62例)

Genotype1・高ウイルス量症例でPeg-IFN a2b+Ribavirin+Telaprevir併用療法の適応（注意事項）

1. Peg-IFN a2b+Ribavirin+Telaprevir 3剤併用療法では、IFN+Ribavirin2剤併用治療に比べ重度の貧血の発現する傾向があることから注意を要する。貧血への対応はHbの絶対値及び減少量の両方を考慮したRibavirinの減量を基本とする。貧血のリスクは高齢者、Hb量低値、女性例において高いことから、これらの3剤併用療法非適応例と予測される場合、Genotype 1・高ウイルス量の初回治療例では、Peg-IFN aまたはIFNβ+Ribavirin併用療法を選択することが望ましい。
2. Peg-IFN a2b+Ribavirin+Telaprevir 3剤併用療法では、Stevens-Johnson症候群、薬剤性過敏症症候群等の重篤な皮膚障害が発現するおそれがあることから皮膚科医との連携のもとで使用し、これら重篤な皮膚障害の発現した場合には3剤全てを直ちに中止する。なお、皮膚症状発現時は早期に適切な処置を行い、皮膚科医との連携のもとでリスク&ベネフィットの観点から治療方針を決定し必要に応じて経口ステロイド剤等の投与も考慮する。
3. Peg-IFN a2b+Ribavirin+Telaprevir 3剤併用療法では、投与初期（1 - 7日間以内）より尿酸値、及びクレアチニンの上昇する症例が存在することから、尿酸値が異常値になった場合、早期に高尿酸血症治療剤の投与が必要である。

テラプレビル/PegIFN/RBVの副作用

PegIFN

発熱，白血球数低下，血小板数低下，皮疹
精神神経症状，間質性肺炎など

RBV

貧血，食欲低下など

テラプレビル

貧血の増悪，腎機能障害，皮膚障害，
食欲低下など

ヘモグロビン値の推移

Peg-IFNa2b+Ribavirin+Telaprevir 3剤併用療法の ヘモグロビン値からみた開始時の両薬剤の減量の目安

開始時Hb値 (g/dl)	Ribavirin	Telaprevir
14.0 以上	通常用量	通常用量 (2250mg)
13.0~14.0未満	女性のみ 200mg 減量	女性のみ 減量 (1500mg)
12.0~13.0未満	200mg 減量	減量 (1500mg)
12.0未満	3者併用療法の安全性は保たれていない	

上記のHb値からみたRibavirinおよびTelaprevirの開始使用量はあくまでも臨床試験からの推定量であって、年齢、体重などを考慮して専門医が判断し決定する必要がある。

貧血を有する女性でも治療継続した症例

61歳女性

前治療再燃
IL28B TT, Core 70野生型
DMあり, HbA1c 7.0%

HCV RNA

6.5

-

-

-

Cr mg/dL
Hb g/dL

テラプレビル/PR療法中のCr値の推移

Cr
(mg/dL)

テラプレビル12W

PEG-IFN/RBV 24W

テラプレビル/PR療法中の尿酸値の推移

開始直後に腎機能障害を生じた症例

ペグイントロン100

テラビック 2,250 mg

レベトール 800 mg

グルコバイ, アマリール

フェブリク 30 mg

63歳, 男性, C-CH (1b)

前治療Breakthrough

IL28B TG, ITPA CC

Core 70野生型

DMあり, HbA1c 5.5%

著明な腎機能障害を生じた症例

71歳, 男性, C-CH (1b)

IL28B TT, ITPA CA

肝がん根治後

UA (mg/dl)

Hb (g/dl)

食欲低下

補液 500ml/日

Cr (mg/dl)

UA
Hb
Cr

皮膚障害のグレード

	グレード1	グレード2	グレード3
罹患面積	体表面積の50%以下		体表面積の50%を越える全身性発疹
	限局性	多発性またはびまん性	
搔痒感	重症度の判定にはいれない		
全身症状	-	軽微な全身症状	発疹の出現や増悪に関連した新規の著明な全身症状(発熱、リンパ節腫脹等)
粘膜病変	-	潰瘍・びらんを伴わない病変	粘膜の潰瘍・びらん
眼病変	-	-	発疹の出現や増悪に関連した眼病変
表皮剥離	-	-	表皮剥離
標的病変	-	-	標的病変
水疱	-	-	小水疱、水疱
その他の特徴	-	-	浸潤を伴う紫斑

グレード1（体表面積の50%以下で限局性）

アンテベート軟膏（Ⅱ群 Very strong）
オイラックスクリーム

処方無し

グレード2（体表面積の50%以下で多発性又はびまん性）

デルモベート軟膏
オイラックスクリーム
アレジオン

マイザー軟膏（Ⅱ群 Very strong）
アンテベート軟膏（Ⅱ群 Very strong）
デルモベート軟膏（Ⅰ群 Strongest）

皮疹で中止になった症例

治療開始4日目で
Grade 2-3の皮疹
皮疹面積 50%
テラプレビル投与中止

62歳, 女性, C-CH (1b)

IL28B TT, ITPA CC

初回治療例

アンテベート軟膏

アレロック処方

ザイザル追加

テラプレビル+PegIFN/RBV療法による グレード別の皮膚症状発現率 (国内臨床試験)

皮膚症状出現率

全体
74例中43例 (58%)

抗ヒスタミン剤
保湿ローション
リンデロンVG軟膏

デルモベート軟膏

PSL 内服
テラプレビルは中止を考慮すべき

テラビック投与後からの皮膚症状出現状況 (広島大学病院)

80%が1週間以内に出現

投与後56日目
多形紅斑出現
(皮膚生検)

66歳, 男性, C-CH (1b)

IL28B TG, ITPA CC

Core 70 変異型

Day 55 薬疹出現
Day 56 受診 Grade 3 → 入院へ

HCV RNA 6.8

検出せず

検出せず

入院時 皮膚所見

注射部位反応

38度台の発熱

体幹の50%以上の皮疹

好酸球の上昇→ **Grade 3**

→ **PSL20mg内服開始,ステロイド外用薬,抗ヒスタミン薬**

水泡出現

口唇に粘膜びらん出現

皮膚生検施行

表皮にリンパ球浸潤を伴う細胞間浮腫を認め、基底膜は不明瞭化し表皮化には軽度の浮腫を認める。

→ 多形紅斑

Grade 4 Stevens-Johnson症候群

3剤併用療法中のBreakthroughの割合 (臨床治験全国集計)

(%)

テラプレビル/PEG-IFN/RBV療法の初期ウイルス量

HCV RNA (log IU/mL)

ウイルス陰性化率

87% (59/70例)

97% (60/62例)

前治療無効例は、テラプレビル耐性株の出現に注意!!

Telaprevir耐性変異

B HCV protease inhibitor resistance mutations

	Telaprevir	BILN 2061	SCH6	SCH 503034
In vitro	A156S/V/T ^{23,31}	R155Q ^{22,25} A156V/T ^{22,25} D168V/A/Y ^{22,25}	A156V/T ²⁴ R109K ²⁴	A156S/T ³⁵ T54A ³⁵ V170A ³⁵
In vivo	V36M/A T54A R155K/T A156S/V/T	No data	No data	T54A ¹⁹

テラプレビル単独投与患者

HCV RNA
(log IU/mL)

MP424 2250 mg/日

Direct Sequence

NS3
aa156

テラプレビル/PEG-IFN/RBV療法の 非SVR例において認められたアミノ酸変異の割合

アミノ酸変異	Gneotype 1a+1b (N=57)	Gneotype 1a (N=2)	Gneotype 1b (N=55)
36, 54, 155, 156位のいずれか	68% (39)	50% (1)	69% (38)
R155K	5% (3)	50% (1)	4% (2)
V36M	5% (3)	50% (1)	4% (2)
V36M+R155K	2% (1)	50% (1)	0% (0)
A156T/V	7% (4)	0% (0)	7% (4)
T54A	37% (21)	0% (0)	38% (21)
T54S	4% (2)	0% (0)	4% (2)
V36A/C	21% (12)	0% (0)	22% (12)
A156S	14% (8)	0% (0)	15% (8)
T54S+A156S, F43C, V36F	2%未満	0% (0)	2%未満

テラプレビルまとめ

✓十分量投与できれば、抗ウイルス効果は高く、24週間で高いSVR率が見込める。

✓貧血、腎機能障害、皮膚障害、食欲低下など種々の副作用が有り、適切な対処を行わないと、治療中止に追い込まれ、最悪の場合生命の危険がでることがある。

✓テラプレビル耐性株の出現の可能性が有り(特にIL28 TG, GG例)、中途半端な投与量でのテラプレビル投与継続は、耐性株出現のリスクを高める。

✓治療可能な症例を、副作用出現を恐れて治療しないのは得策ではない。投与可能な症例に対しては、肝臓専門医がしっかり連携を取り、副作用の出現に注意しながら、治療すべき。

DAA in Development: SVR in Treatment-naïve G1 patients (3剤併用療法)

EASL2012

NS5A阻害剤

プロテアーゼ阻害剤

4剤併用療法

Daclatasvir + Asunaprevir + PegIFN/RBV in G1 null responders (2剤無効例に対する)

DAAの耐性profile

第一世代プロテアーゼ阻害剤 (テラプレビル)

第二世代プロテアーゼ阻害剤
(TMC435, MK7009, BI 201335)

Target	Variant	NS3 Linear	NS3 Macrocytic	NS5A inhibitor	NS5B nucleoside	NS5B Palm	NS5B Thumb	NS5B Finger	IFN	RBV
NS3 Protease	V36M	R	S	S	S	S	S	S	S	S
	T54A	R	S	S	S	S	S	S	S	S
	R155K	R	R	S	S	S	S	S	S	S
	A156T	R	R	S	S	S	S	S	S	S
	D168V	S	R	S	S	S	S	S	S	S
NS5A	L28V	S	S	R	S	S	S	S	S	S
	Y93H	S	S	R	S	S	S	S	S	S
NS5B	S282T	S	S	S	R	S	S	S	S	S
	C316Y	S	S	S	S	R	S	S	S	S
	M414T	S	S	S	S	R	S	S	S	S
	R422K	S	S	S	S	S	R	S	S	S
	M423T	S	S	S	S	S	R	S	S	S
	P495S	S	S	S	S	S	S	R	S	S

S = Susceptible
(< 4 fold shift in HCV replicon EC50)

R = Resistant
(> 4 fold increase in EC50)

進行中のIFN非使用DAAs併用療法の臨床試験

	プロテアーゼ 阻害剤	NS5A 阻害剤	核酸型 ポリメラーゼ 阻害剤	非核酸型 ポリメラーゼ 阻害剤	製造元	Phase
1	ABT-450/r		ABT-072		Abbott / Enanta	II
2	ABT-450/r		ABT-333		Abbott / Enanta	III
3	ABT-450/r		ABT-267		Abbott / Enanta	III
4	BI201335			BI207127	Boehringer Ingelheim	II
5	Asunaprevir	Daclatasvir			BMS	III
6		Daclatasvir	GS-7977		BMS/ Gilead	II
7	TMC435	Daclatasvir			BMS/ Gilead / Tibotec	II
8	Bpceprevir		Mericitabine		Merck / Genentech	II
9	GS-9256			Tegobuvir	Gilead	II
10	TMC435		GS-7977		Gilead / Tibotec	II
11	Danoprevir		Mericitabine		Genentech	II
12	Telaprevir			VX-222	Vertex	II
13	TMC435			TMC647055	Medivir / Tibotec	II

プロテアーゼ阻害剤 + NS5A阻害剤 臨床治験Phase 2a 試験

前治療無効例(12例)

不適格あるいは不耐容(22例)

プロテアーゼ阻害剤 + NS5A阻害剤 ウイルス陰性化率

%

■ 前治療無効例(12例) ■ 不適格あるいは不耐容(22例)

1b型高ウイルス量のC型慢性肝炎に対する IFNの治療成績の変遷

まとめ

- テラプレビルを用いた3剤併用療法は、SVR率は高いが副作用も強い
- 第2世代の3剤併用療法は、SVR率は同程度で副作用は比較的軽い（現在治験進行中）
- IFN非使用の内服2剤併用療法は、SVR率は同程度で副作用は非常に少ない。（現在治験進行中）
- 4剤併用療法は、ペグリバ2剤の無効例に対しても、非常に高いSVR率おそらく最強の治療法となるであろう。（治験は未定）

肝臓学会内では①とさえテラプレビルで治療して、ダメなら次の治療にかける、②発癌しそうな一部の症例を除いては、次世代の治療を待つべき、の意見に二分されている。

新薬がでるまでに肝炎が進行しないよう、肝炎を抑える治療も重要